


Æxlunarfæri karla

- Æxlunarfærin skiptast í
ytri- og innri kynfæri
 - Ytri: Typpið og pungurinn
 - Innri: Eistun, eistnalyppur, sáðrásir, sáðblöðrur, blöðruhálskirtill og þvagrás.

Æxlunarfæri karla



- **Typpið**
 - Losar þvag og kemur sáðfrumum inn í líkama konu.
- **Pungurinn**
 - Skinnpoki utan um eistun, sem framleiða sæði
- **Eistu**
 - Gefa frá sér hormón og framleiða sáðfrumur. Kynkirtlar karla. Samsvara eggjastokkum konunnar. Eistun eru tvö og eru mjög viðkvæm.

Æxlunarfæri karla

- Sæðisfrumur

- Myndun og þroskun þeirra tekur 6-7 vikur.
- Myndast við rýriskiptingu. Þroskast í hlykkjóttum göngum í eistunum.
- Fullþroska sæðfrumur geymdar í eistnalyppunum.
- Ef þær losna ekki úr líkamanum eyðast þær.
- Myndast jafnt og þétt frá kynþroskaskeiði og fram á elli ár
- Geta lifað 12-36 klst. í konu og allt upp í 4-5 daga.
- Eru viðkvæmar fyrir hita.



Æxlunarfæri karla

- Eistnalyppur
 - Liggja utan um eistun.
 - Geyma fullproskaðar sæðisfrumur.
- Sáðrásir
 - Eru tengdar eistnalyppunum, liggja gegnum blöðruhálskirtilinn sameinast þar og tengjast þvagrásinni, þaðan er greið leið út.
- Sáðblöðrur
 - Eru tvær og opnast hvor í sína sáðrás.
 - Framleiða sáðvökva.
- Þvagrásarkirtlar
 - Mynda slímugan vökva fyrir sáðlát

- Blöðruhálskirtill
 - Liggur fyrir neðan þvagblöðruna og umlykur þvagrásina og blöðruhálsinn. Hann er á stærð við valhnetu og hlutverk hans er að **framleiða sæðisvökva**. Hann vex og þroskast við kynþroska þegar framleiðsla á testósterón hefst. Stærð hans helst óbreytt til fertugsaldurs.
 - Þegar karlmenn eldast er eðlilegt að hann stækki. Góðkynja stækkun. Getur valdið þrýstingi á þvagrás og valdið vandkvæðum við þvaglát. Ekki krabbamein.
 - Krabbamein í blöðruhálskirtli er algengasta krabbamein hjá karlmönnum. Algengara eftir því sem menn eru eldri.

Sáðvökví:

- Hefur það hlutverk að flytja, vernda og næra sæðisfrumur
- Drepur bakteríur
- Afsýrir leggöngin
 - umhverfið í leggöngum er of súrt fyrir sæðfrumurnar

Sæði

- Sáðvökvinn, slímið og sáðfrumurnar kallast einu nafni SÆÐI.
- Í sæði eru sáðfrumur sem eistum mynda og sáðvökvi sem kemur frá blöðruhálskirtli, sáðblöðrum og þvagrásarkirtlum.
- Í hverju sáðláti eru 2.5 – 5ml sæðis
 - Í hverjum ml eru 50 – 150 milljón sáðfrumur
 - innan við 1% sáðfruma ná að egginu

Æxlunarfæri kvenna

- Eggjastokkar
- Eggrás
- Leg
- Legháls
- Leggöng
- Leggangaop
 - Einnig: ytri og innri barmar, snípur og meyarhaft.



Æxlunarfæri kvenna

- Leggöngin
 - 7-9 cm langur gangur.
 - Nær frá meyjjarhaftinu upp að neðsta hluta legsins, leghálsinum.
 - Veggir eru teygjanlegir og geta þanist vel út t.d. við barnsburð.
 - Venjulega eru veggirnir rakir og valda því kirtlar sem í þeim sitja.
 - Gefa frá sér súran vökva sem er til verndar gegn bakteríum og gera veggina slétta og sleipa.
 - Stundum myndast mikill vökvi í leggöngunum þannig að dálítill útferð verður. Getur aukist við kvef og streitu.


Æxlunarfæri kvenna

- Legið
 - Holur, perulaga vöðvi og snýr mjórri endinn niður.
 - Endinn er leghálsinn sem skagar niður í efsta hluta legganganna.
 - Á stærð við hænu egg í stúlkum en eftir barnsburð nokkuð stærri.
 - Klætt slímhúð, sem frjóvgað egg festist í og verður að fóstri.
 - Ef egg frjóvgast ekki berst það niður legið og út úr líkamanum með blóði.




Æxlunarfæri kvenna

- Eggrásir
 - Eru tvær og liggja frá leginu til eggjastokkana.
 - Álíka gildar og blýantur og enda í eins konar trekt, þar sem eggjastokkarnir liggja.
- Eggjastokkar
 - Eru tveir við endann á eggrásunum.
 - Á stærð við stórt vínber.
 - Á fjórðu hverju viku skiptast þeir á að mynda fullþroskað egg.
 - Mynda hormón sem stjórnar kvenlegum eiginleikum, tíðum, og eiginleikum legsins til að frjóvgað egg geti þroskast.




Æxlunarfæri kvenna

- Egg
 - Myndast í eggjastokkunum strax á fósturskeiði, bíða svo og þroskast ekki fyrr en kynþroska er náð.
 - Fullþroskað egg berst úr eggjastokkunum inn í eggrásirnar.
 - Frjóvgast yfirleitt í eggrásunum.
 - Utanlegsfóstur er oftast í eggrásunum.
 - Við fæðingu stúlkna er u.þ.b. 400.000 eggvísar.
 - Aðeins um 400 ná að fullþroskast.
 - Byrja að þroskast við 10-17 ára aldur og hætta við 45-50 ára aldur.
 - 0.1 mm í þvermál, 100X stærri en sáðfruma



Æxlunarfæri kvenna

- Egg
 - Eitt egg losnar á 28 daga fresti.
 - Eggjastokkarnir skiptast á að þroska og losa egg.
 - Egglos á sér stað u.þ.b. 2 vikum fyrir upphaf blæðinga.
 - Færist eftir eggrásinni vegna vöðvasamdráttar.
 - Aðeins ein sáðfruma getur frjóvgað eggð.



Æxlunarfæri kvenna

- Tíðarhringur
 - Breytingar á hormónamyndun í eggjastokkunum og breytingar á slímhúð legsins.
 - Telst frá fyrsta degi blæðinga.
 - Estrógen og prógesterón eru aðal hormónin.
 - Við myndun eggs eykst magna estrógens.
 - Við egglos myndast prógesterón sem örvar slímmyndun í leginu.
 - Magn hormónana minnkar eftir því sem nær dregur blæðingum og þegar ákveðnu lágmarki er náð hefjast blæðingar

Egg ferðast í legið;
ef það frjóvgast ekki,
eyðist það

Legslíman heldur
áfram að þykkna



Egglos

Túr hefst

Legslíman losnar

Nýtt egg þroskast

Legslíman byrjar
að þykkna

Ath: Þessi mynd sýnir 28 daga tíðahring.
Tíðahringir sumra kvenna eru lengri eða styttri.